

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України

23.04.04 № *417*

Реєстраційне посвідчення

№ *UA/6238/01/01*

МАРИМЕР
Спрей назальний

ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Прочитайте уважно цей листок-вкладш перед тим, як розпочати застосування препарату!

Зберігайте цей листок-вкладш. Вам може знадобитися перечитати його.

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

Склад лікарського засобу:

діюча речовина: 100 мл розчину містять стерильний розчин морської води 31,82 мл;

допоміжні речовини: вода очищена.

Лікарська форма. Спрей назальний.

Фармакотерапевтична група. Засіб, що застосовується при захворюваннях порожнини носа.

Фармакологічні властивості.

Сприяє підтриманню нормального фізіологічного стану слизової оболонки носа.

Сприяє розрідженню слизу і полегшує його видалення з носової порожнини.

Мікроелементи, які входять до складу препарату, покращують функцію миготливого епітелію, що посилює резистентність слизової оболонки носа до патогенних бактерій і вірусів.

При алергічних ринітах сприяє видаленню алергенів зі слизової оболонки носа, зменшенню місцевого запального процесу.

Мікродифузна система розпилення препарату забезпечує глибоке і м'яке зрошення слизової оболонки носа, що сприяє ефективному впливу мікроелементів.

Показання.

- Гострі і хронічні запальні захворювання порожнини носа, придаткових пазух і носоглотки;
- профілактика інфекційних захворювань носа і носоглотки;
- алергічні і вазомоторні риніти;
- профілактика запальних процесів після оперативних втручань;
- щоденна гігієна порожнини носа для збереження захисних властивостей слизової оболонки в умовах підвищеної сухості або забруднення повітря (кондиціонування, центральне опалення тощо).

Протипоказання. Підвищена чутливість (алергія) до компонентів препарату, діти віком до 1 року.

Застереження при застосуванні.

Не розпилювати під прямими сонячними променями та при високій температурі.

Застосування в період вагітності та годування груддю.
Дозволено застосування в період вагітності та годування груддю.

Взаємодія з лікарськими засобами.

Препарат системно не впливає на організм, взаємодія з іншими лікарськими засобами не відмічена. Може застосовуватися з іншими лікарськими засобами у складі комбінованої терапії.

Спосіб застосування та дози.

Інтраназально.

Дітям з 1-го року і дорослим з лікувальною метою по одному впорскуванню у кожний носовий хід 4-6 рази на добу, з гігієнічною метою – 1-4 рази на день.

Курс лікування становить до 4 тижнів. Рекомендується повторити курс лікування через місяць.

Випадки *передозування* не відмічені.

Побічні ефекти.

Препарат переноситься добре, але при підвищеній чутливості до компонентів препарату можуть виникнути алергічні реакції.

У разі виникнення будь-яких незвичних реакцій обов'язково порадьтеся з лікарем щодо подальшого застосування препарату!

Термін придатності. 3 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Зберігати при температурі не вище 25° С у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 100 мл у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

Правила відпуску. Без рецепта.

Назва та адреса виробника. Лабораторії ЖІЛЬБЕР, Франція.

Представлено в Україні „Нікомед Австрія ГмБХ”, Австрія.
928 Avenue du General de Caulle, 14200 Herouville Saint, France.

Перший заступник директора
Державного фармакологічного центру
МОЗ України, д.мед.н., проф.



А.М. Морозов